



Heilivágur til seyð

Árstíð	Seyður at viðgera	Viðgerð fyri	Tilbúningur	Skamtur	Útfl.
Apríl 2-8 vikur undan lembing	Allar ær, sum lemba	Blóðsótt og bráðsótt Ger ólembda lambið immunt gjøgnum rámjólkina	Covexin® 10 inj.	1 ml	H
	Allar ær, sum lemba	Orm í vinstur, vilum og lungum	Endospec SC ® miksturur	1 ml pr. 20 kg	R
	Allar ær, sum lemba	Orm í vinstur, vilum og lungum, lýs og skrubb	Noromectin ® inj.	1 ml	R
Mai Minst 2 vikur eftir lembing	Nýlembd lomb undan óm, ið ikki eru koppsettar við Covexin® Koppsetast min. 2 vikur aftan á lembing	Blóðsótt	Covexin® 10 inj.	1 ml	H
	4-8 vikur gomul lomb	Beinveikleiki (D-vitamintrót)	Vitamin D3 vet. oralur loysingur	5 ml	H
	Ær	Mjólkafeður	Calciject ® CMD-6 inj.	60-80 ml	H
	Øll lomb	Bráðsótt	Covexin® 10 inj.	1 ml	H
Juli Áseyðaroyting	Allur hagaseyður	Orm í vinstur, vilum og lungum	Endospec SC ® miksturur	1 ml pr. 20 kg	R
	Allur hagaseyður	Orm í vinstur, vilum og lungum, lýs og skrubb	Noromectin ® inj.	1 ml pr. 50 kg	R
	Sleppingarlomb og brundlomb	Blóðsótt og bráðsótt	Covexin ® 10 inj.	1 ml	H
Okt. - nov. Skurðfjall og klipping	Sleppingarlomb og brundlomb	Garnasótt	Koppingarevni fyri garnasótt	1 ml	H
	Allur hagaseyður	Iglar og orm í vinstur og vilum	Combinex ® miksturur	2 ml pr. 10 kg	R
	Allur hagaseyður	Smáar lýs og førilýs	CROVECT ® pour on	ca. 15 ml pr. seyð	R
	Allur hagaseyður	Orm í vinstur, vilum og lungum, lýs og skrubb	Noromectin ® inj.	1 ml	R
	Ær	Beinveikleiki (D-vitamintrót)	Vitamin D3 vet. oralur loysingur	5 ml í nov. og 5 ml í des.	H
Um jóltíðir	Allir seyðahundar	Bendilorm/rundorm	Milbemax	(0,5mg+5mg)/kg	R

H = Fæst í handkeypi

R = Kann bert útvegast við djóralæknaforsskrift